

# INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN

## FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS ORNITOLÓGICO

<b>ZONA 2</b>	COLAS DEL EMBALSE DE VADOMOJÓN.		
<b>TÉRMINO/S MUNICIPAL/ES</b>	ALCAUDETE	<b>EXTENSIÓN</b>	1.243 ha.
<b>COORDENADAS PTO CÉNTRICO</b>	GEOGRÁFICAS	LONGITUD: 04 11 48.0 O	LATITUD: 37 38 48.3 N
	UTM	X: 394433	Y: 4167296
<b>ACCESO</b>	Desde la localidad de Noguerones se toma la pista forestal que recorre gran parte de una de las colas inundables de este embalse.		
<b>DESCRIPCIÓN DEL LUGAR</b>	Tramo inundable del embalse de Vadomójón. Dependiendo del nivel de llenado, el recorrido aquí propuesto permite acceder a una zona de ribera, con abundancia de tarayal ( <i>Tamarix</i> sp) hasta llegar a la lámina de agua. El entorno está formado por olivar de campiña y, en algunas laderas, retazos de vegetación natural con encinas ( <i>Quercus rotundifolia</i> ) y pastizales.		
<b>ESPECIES DE INTERÉS ORNITOLÓGICO</b>			
<b>RESIDENTES</b>	<b>INVERNANTES</b>	<b>ESTIVALES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zampullín común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)</li> <li>- Somormujo lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)</li> <li>- Garza real (<i>Ardea cinerea</i>)</li> <li>- Ánade real (<i>Anas platyrhynchos</i>)</li> <li>- Cerceta común (<i>Anas crecca</i>)</li> <li>- Cuchara común (<i>Anas clypeata</i>)</li> <li>- Porrón europeo (<i>Aythya ferina</i>)</li> <li>- Pato colorado (<i>Netta rufina</i>)</li> <li>- Búho real (<i>Bubo bubo</i>)</li> <li>- Aguilucho lagunero occ. (<i>Circus aeruginosus</i>)</li> <li>- Busardo ratonero (<i>Buteo buteo</i>)</li> <li>- Águila – azor perdicera (<i>Aquila fasciata</i>)</li> <li>- Polla de agua (<i>Gallinula chloropus</i>)</li> <li>- Focha común (<i>Fulica atra</i>)</li> <li>- Calamón (<i>Porphyrio porphyrio</i>)</li> <li>- Cuco (<i>Cuculus canorus</i>)</li> <li>- Martín pescador (<i>Alcedo atthis</i>)</li> <li>- Tórtola común (<i>Streptopelia turtur</i>)</li> <li>- Perdiz roja (<i>Alectoris rufa</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cormorán grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)</li> <li>- Águila pescadora (<i>Pandion haliaetus</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Culebrera europea (<i>Circaetus gallicus</i>)</li> <li>- Autillo (<i>Otus scops</i>)</li> <li>- Chotacabras pardo (<i>Caprimulgus ruficollis</i>)</li> <li>- Cuco (<i>Cuculus canorus</i>)</li> <li>- Tórtola común (<i>Streptopelia turtur</i>)</li> <li>- Vencejo real (<i>Apus melba</i>)</li> <li>- Abubilla (<i>Upupa epops</i>)</li> <li>- Abejaruco común (<i>Merops apiaster</i>)</li> <li>- Torcecuello (<i>Jynx torquilla</i>)</li> </ul>	
<b>OTROS DATOS DE INTERÉS</b>			
Época recomendada para la visita	Cualquier época del año.		
Equipamientos de Uso Público	No existe.		
Propuestas de aprovechamiento sostenible	Instalación de panel informativo y observatorios de aves a lo largo del camino que recorre la cola del pantano.		
Riesgos ambientales de su aprovechamiento	No existen riesgos destacables.		
Indicadores de seguimiento	- Censos periódicos de avifauna – mantenimiento de especies clave.		

CARTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA

